

استخدام صبغة الكونغو الحمراء في الوسط
الزرعي لتسريع عزل وتنقية
وتشخيص الأنواع التابعة لجنس
Azospirillum

خليل مصطفى خماس، ندى زكي مهدي، ليلى عبد الحميد سعيد
قسم علوم الحياة - كلية العلوم - الجامعة المستنصرية

Abstract

151 isolates of *Azospirillum* were identified out of 289 nitrogen fixing bacteria, these isolates were obtained from soil rhizosphere and sterilized rice roots of different regions in Iraq, by using biochemical and physiological characters, the isolates were differentiated into three species namely: *A. brasilense*, *A. Lipoferum*, and *A. irakense* and their numbers were 88,16 and 47 respectively. All isolates of *A. irakense* (except two) were obtained from sterilized root. By using modified Red Congo medium for isolation, purification and identification. The isolates were classified into three groups (A, B and C) according to colony colors. The results indicated that there is a relationship between biochemical characters and textures, shapes , colors of the colonies. It seems that there is a similarity between colonies of the same group, which differ from the other groups.

الخلاصة

شخصت 151 عزلة تعود لجنس *Azospirillum* من مجموع 289 عزلة مثبتة للنتروجين تم الحصول عليها من منطقة الرايزوسفير وجذر نبات الرز لمناطق مختلفة من العراق، وباستخدام الاختبارات الكيموحيوية والخصائص الفسيولوجية الأخرى أمكن توزيع العزلات على الأنواع الآتية: *lipoferum*, *A. irakense*, *A. A. brasilen* و باعداد بلغت 88 و 16 و 47 على التوالي: كانت جميع عزلات النوع *A. irakense* (باستثناء عزلتين) من جذر النبات المعقم، استخدمت اطباق وسط الكونغو الحمراء المحور للعزل والتقنية والتشخيص، اظهرت مستعمرات العزلات اختلافاً واضحاً في شكل وتوزيع الصبغة فيها، لذا فقد قسمت إلى ثلاثة مجاميع (A, B, C). دلت النتائج على وجود ارتباط وصلة وثيقة بين الخصائص الكيموحيوية مع نتائج اختبارات شكل المستعمرة وانتشار الصبغة والمناطق التي كونتها. تبين وجود تشابه لكل عزلات المجموعة الواحدة لطبيعة المستعمرات في الوقت الذي اختلفت فيه عن المجموعات الأخرى.

المقدمة

منذ إعادة عزل بكتريا *Azospirillum* حظيت هذه البكتريا بدراسة مكثفة بسبب تأثيرها المفيد على بعض مجاميع المحاصيل النباتية، وتمتلك هذه البكتريا عدة اليات تشتمل على إنتاج الهرمونات مثل cytokinine, auxin وغيرها (2،10)، وتثبيت النتروجين وتسريع نمو النبات (2، 6)، وكونها تستعمر عادة قشرة الجذر ومنطقة الرايزوسفير لمجموعة كبيرة من النباتات المهمة زراعياً (1، 4)، وهناك لحد الان عشرة أنواع مكتشفة تقع ضمن جنس *Azospirillum*، ومن ضمنها:

(13، 6، 5) *A. irakense*, *A. zae*, *A. lipoferum*, *A. brasilense*, *A. oryzae*, *A. canadense*

اعتمد في تشخيص هذه الأنواع على الصفات المظهرية (phenotype characters) (تشمل الشكل الظاهري والصفات الكيمو حيوية) واستخدام التقنية الجزيئية (DNA/ DNA hybridization) (7،15) إضافة إلى وسائل أخرى مستندة على التقنية الجزيئية (11) ومع كل هذا بقيت الصعوبات كثيرة نتيجة التشابه بين هذه الأنواع عند نموها على الأوساط الزرعية وإطالة فترة العزل والتنقية والتشخيص فضلاً عن العدد الكبير من الاختبارات الكيمو حيوية اللازمة لتفريق هذه الأنواع (13)، إضافة لوجودها مع مجاميع أخرى من البكتريا المثبتة للنتروجين وارتباط هذه المجاميع بشدة مع التربة وجذور النباتات مما جعل العزل والتنقية أمراً في غاية الصعوبة (12،5)، كما وإن بكتريا *Azospirillum* تعد بطيئة النمو وزمن الجيل طويل نسبياً مقارنة مع الأجناس البكتيرية الأخرى المتواجدة معها (16).

ويتم عزل *Azospirillum* روتينياً من خلال تمييزها على وسط Nfb الأغنائي (8) الذي يسمح بنمو مجاميع بكتيرية أخرى مثبتة أخرى للنتروجين (11)، لذا اقترح الباحثون بضرورة تطوير وسط انتقائي لعزل هذه البكتريا (15) أو من خلال تقليل تركيز المصدر الكربوني في الوسط (14) أو باستخدام الكونغو الحمراء في الوسط الزرع (12). استخدمت الصباغ الحيوية بصورة روتينية لصبغ البكتريا والأحياء المجهرية الأخرى (16،17) واعتبر (14) أن التصبغ احد طرق التشخيص الجرثومي كاصطباغ المستعمرة في الوسط الزرع أو عدم اصطباغها أو قدرة الصبغة على تثبيط بعض الأنواع البكتيرية ليتحول الوسط من عام إلى وسط انتقالي.

كانت صبغة الكونغو الحمراء ذات فائدة كبيرة في تشخيص بكتريا (19) *Pasteurella pestis* وتشخيص (20) *Shigella sonnei*، كما وان هذه الصبغة قد استخدمت لتفريق بكتريا *Rhizobium* عن بقية الاجناس (21). وكان استخدام هذه الصبغة في الوسط الزرع لعزل بكتريا *Azospirillum* وتمييزها عن بقية أنواع الأجناس المثبتة للنتروجين مثل *Pseudomonas*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Bacillus* والمتواجدة معها قد استخدم من قبل Caceres (12) ووضح أهمية الصبغة في تمييز جنس *Azospirillum* عن بقية المجاميع الأخرى، حيث أن الأخيرة لا تمتص الصبغة عكس عزلات جنس *Azospirillum*. وعندما استخدمت هذه الصبغة لهذا الغرض لم تتم الإشارة أو التطرق إلى قابلية الصبغة على تفريق أو تمييز الأنواع ضمن هذا الجنس (3، 12، 22)، سوى ما ذكره (Bashan and Levanony) (23) من أن الوسط الحاوي على صبغة الكونغو الحمراء مع بعض المضادات الحيوية استطاع تمييز عزلات

النوع *Azospirillum brasilense* عن بقية الأنواع. وفي دراسة لاحقة (24) استطاعت وباستخدام هذه الصبغة من تمييز ثلاثة أنواع ضمن جنس *Azospirillum* وذلك من خلال اشكال المستعمرات وشدة الصبغة وانتشارها .

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم استخدام صبغة الكونغو الحمراء في الوسط الزراعي الصلب لعزل وتنقية وتشخيص العزلات لأنواع جنس *Azospirillum* وبيان مدى الصلة بين الخصائص أو الصفات الظاهرية والكيموحيوية مع خصائص المستعمرات النامية على وسط هذه الصبغة.

المواد وطرائق العمل

الأوساط الزرعية: استخدم نوعين رئيسيين من الأوساط:

1. وسط Nfb الاغثائي الشبه الصلب (semi - solid) والخالي من النتروجين والخاص لعزل بكتريا *Azospirillum* (6) والذي احتوى على المكونات التالية (غم/ لتر):
NaCl(0.1), MgSo₄.7H₂O(0.2), K₂HPO₄(0.5), DL.malic acid(5) MnSo₄.H₂O(0.1), EDTA (1.64 % وزن/ حجم)، (2 مل) Bromothymol blue (0.5 %) في (0.2) KOH . 0.001 بيوتين (Biotin)، (4.8) KOH، (1.8) اكار وضبط الاس الهيدروجيني على 6.8 وعند استخدام مصادر كربونية أخرى للاختبارات استبدل المصدر الكربوني أعلاه بينما بقيت المحتويات الأخرى كما هي.
2. وسط الكونغو الحمراء (RC) (12): استخدم هذا الوسط للعزل والتنقية حسب طريقة (12) مع اجراء بعض التحويلات على مكونات الوسط وكالاتي (غم/ لتر):
(0.015)، NH₄Cl(1)، NaCl(0.1), MgSo₄.7H₂O(0.2), K₂HPO₄(0.5), DL.malic acid(5) FeCl₃6H₂O (0.2) مستخلص الخميرة، (0.001) بيوتين، (4.8) KOH، (20) اكار وتم ضبط الاس الهيدروجيني على 6.8 بوساطة (0.1N) KOH

جميع العينات وطرائق العزل

- اقتلعت (3) إلى (5) من نباتات الرز مع كتلة التربة المحيطة بجزورها وبصورة عشوائية ومن ثلاث مناطق للحقل الواحد تبعد الواحدة عن الأخرى بحدود (20) كيلومتر لحقول تقع ضمن محافظات النجف وديالى والقادسية وحفظت العينات في أكياس بلاستيكية معقمة ودرجة 4° م واستخدمت في مدة أقصاها أسبوع بعد الجمع عندها استخدمت عينات من تربة الرايزوسفير المحيطة بالجزور، ومن جذور نفس النبات (3 نباتات)، وغسلت نماذج الجذور عدة مرات بالماء المعقم، وتم عوملت مع (1%) من Chloramine T وغسلت بعدئذ لمرات عدة حسب طريقة (25) سحقت الجذور بعدها أو قطعت إلى قطع صغيرة (1 إلى 2 سم)

ووضعت في أنابيب احتوت على 5 مل من وسط Nfb ثم حضنت بدرجة حرارة 35°م ولمدة 72 ساعة. وبعد ظهور النمو البكتيري على وسط Nfb و بشكل حلقة (pellicle) بيضاء كثيفة تحت السطح (3 إلى 7 ملم) ثم تخطيطها (streaked) على وسط RC وحضنت بدرجة حرارة 35°م ولمدة 72 ساعة وبعد ظهور المستعمرات ذات اللون الأحمر تم التقاطها وتخطيطها مرة ثانية على أطباق وسط RC المحور وحسب ما ذكره (12) لغرض التأكد من نقاوة المستعمرات عن المجاميع البكتيرية الأخرى التي ظهرت معها عند عملية التخطيط الأولى والتي كانت عديمة اللون.

التشخيص

اخضعت جميع العزلات إلى الاختبارات الكيموحيوية والفسولوجية باستخدام مجموعة من المصادر الكربونية المختلفة، إضافة إلى ملاحظة الشكل الخارجي للخلايا بواسطة المجهر الضوئي (جدول 1 من النتائج) اعتماداً على ما أشار له (12، 8، 7، 6)، وكما استخدمت ثلاث سلالات متوفرة بمثابة type strains وهي ATCC 29145)Sp7 للنوع *A. brasiliense*، ATCC 29707)Sp5b للنوع *A. lipoferum* و KBCI النوع *A. irakense* كمصدر للمقارنة وتقييم النتائج، كما درست أشكال المستعمرات وألوانها وانتشار صبغة الكونغو الحمراء بوساطة مجهر تشريح.

قياس فعالية أنزيم النيتروجينيز:

لقت الأنابيب الحاوية على (5) مل من وسط Nfb للعزلات النامية على وسط RC المحور وحضنت بدرجة 30°م ولمدة 72 ساعة. وقدرت فعالية أنزيم النيتروجينيز بطريقة اختزال الاستيلين (26) وتم التعبير عن النتائج من خلال تحرير غاز الاثيلين (نانومول/مل/ ساعة).

النتائج والمناقشة

من مجموعة 162 مستعمرة حمراء نامية على وسط RC المحور شبيهة بـ *Azospirillum* أعطت (151) عزلة منها نتائج ايجابية لفحص اختزال الاستيلين، فيما أهملت بقية العزلات التي لم تظهر أية فعالية مقبولة لهذا الفحص وأظهرت (15) عزلة فعالية منخفضة لأنزيم النيتروجينيز تراوحت بين (7) إلى (15) نانومول /مل/ ساعة وهي ضمن الحدود المقبولة (15، 27)، أما بقيت العزلات (136) عزلة) فتراوحت فعالية النيتروجينيز ما بين (30) إلى (320) نانومول /مل/ ساعة.

درست العزلات (151 عزلة) تفصيلاً وقسمت إلى ثلاثة مجاميع A, B, و C استناداً إلى الاختبارات الكيمو حيوية والخصائص الفسيولوجية والمظهر الخارجي، إذ بلغ عدد العزلات 88 و 16 و 47 لكل مجموعة على التوالي.

يشير الجدول (1) إلى أن المجموعة A لم تستطع استخدام السترات والمانيتول والسكرور، وكذلك الكلوكوز :- باستثناء (4) عزلات من أصل (88):- فيما لم تظهر الحاجة إلى البيوتين ولم تنتج حامضاً من سكري الفركتوز أو الكلوكوز لكنها كانت قادرة على استخدام D-alanine إضافة إلى أن أشكال خلاياها كانت تشبه ضمة قصيرة ثابتة الشكل واستناداً إلى (8،7،6) فإن تلك الصفات تعود للنوع *A. brasilense*. أما عزلات المجموعة B (16 عزلة) وكما يتضح ذلك من جدول (1) فكانت بحاجة إلى البيوتين، منتجة حامضاً من الكلوكوز والفركتوز، واستخدمت السترات والكلوكوز والمانيتول والكليسرول بينما لم تستخدم السكرور وبعض السكريات الثنائية، هذا إضافة إلى أن الخلايا كانت متعددة الأشكال (بعضها قصيرة والأخرى طويلة) واستناداً إلى (8،7،6) فإن تلك الصفات تعود للنوع *A. lipoferum*.

والمجموعة C والتي بلغ عدد عزلاتها (47) فالجدول (1) يبين أن عزلاتها ليست بحاجة إلى البيوتين واستخدمت الكلوكوز لكن لم تنتج حامضاً منه، واستخدمت السكرور، المالتوز، السليبيوز و التري هالوز ولم تستخدم المانتول أو الكليرول إضافة إلى قابليتها على تحلل البكتين (بعد 7 إلى 9 أيام) من الحضان كما إنها سريعة الحركة على وسط Nfb وذات خلايا نحيفة وهذه الصفات واستناداً إلى (28،10،7) تنطبق على النوع *A. irakense*.

لقد استبعدت المجموعة C أو بعض عزلاتها من أن تكون ضمن النوع *A. amazonense* (وجود شبه كبير بين النوع *A. irakense*، *A. amazonense* من الناحية الكيمو حيوية) (7)، فقد استطاعت جميع عزلات المجموعة C من النمو على وسط Nfb الحاوي على (3%) NaCl وحللت البكتين واستطاعت النمو وتثبيت النتروجين في اس هيدروجيني مقداره 7.5 إضافة إلى إنها أظهرت swarming على الوسط الحاوي على 7.5 غم/ لتر من الاكار (soft agar) (29،10) وبذلك فإن كل هذه الصفات تميز النوعان *A. irakense*، *A. amazonense*، كما استبعدت عزلات المجاميع الثلاثة (A, B, C) من أن تكون هي أو بعضها تعود للنوع *A. halopraefens* لكون هذا النوع لا ينمو على وسط RC ولا عند اس هيدروجيني مقداره 6.0 كما لا ينمو بحرارة 35° م (12)، علماً أن جميع العزلات قد تم تمييزها بهذه الدرجة الحرارية لم يتم الحصول على أية أنواع أخرى غير التي ذكرت أعلاه.

جدول (1) نتائج الاختبارات التفريقية الكيموحيوية للعزلات بين مجاميع بكتريا *Azospirillum* (1)

المجموعة C(c)	المجموعة B(b)	المجموعة A(a)	الفحص
ثابتة الشكل تشبه الضمة خلايا نحيفة	متعددة الأشكال ومتغيرة (طويلة وقصيرة)	قصيرة تشبه الضمة، ثابتة الشكل	شكل الخلايا على وسط Nfb
-	-	-	صبغة كرام
+	+	+	Oxidase
+	V	+	Catalase
-	+	-	الحاجة إلى البيوتين
-	+	-	تكوين حامض من الفركتوز والكلوكوز
			استخدام المصادر الكربونية:
+	+	+	D-glucose
-	+	-	D-mannitol
-	+	-	Citrate
+	-	-	Sucrose, Maltose
-	+	+	Trehalose, D-Xellobiose Lactose
V	-	+	Glycerol
V	-	+	D. alanine
+	+	+	L- alanine, malate L- alanine, malate Acetate
+	-	-	تحلل البكتين (7 إلى 9 يوم)

(1) جميع العزلات البالغة 151 قد اختبرت

+ = جميع العزلات موجبة الفحص.

- = جميع العزلات سالبة الفحص.

+ = أكثر من 90% من العزلات سالبة الفحص.

V = النتيجة متغيرة (سالبة أو موجبة) بين العزلات.

(a) = مجموعة A = عزلات تعود للنوع *A. brasilense* وعددها (88) عزلة.

(b) = مجموعة B = عزلات تعود للنوع *A. lipoferum* وعددها (16) عزلة.


(c) = مجموعة C = عزلات تعود للنوع *A. irakense* وعددها (47) عزلة.

وعند دراسة مستعمرات العزلات لكل مجموعة كُلى على حدة على وسط الكونغو الحمراء المحور بعد اكتمال دراستها من الناحية الكيموحيوية والشكل الظاهري وإيجاد صلة أو علاقة في هذا الجانب فقد أظهرت مستعمرات كل مجموعة اختلافاً واضحاً عن المجموعة الأخرى، وتشابهت عزلات كل مجموعة مع بعضها البعض على هذا الوسط وخاصة عند استمرار حضان المستعمرات لمدة أسبوع.

يوضح الشكل (1) إن مستعمرات المجموعة A والتي شخصت ضمن النوع *A. brasilense* (من هذه الدراسة) قد تميزت بامتصاصها الشديد للصبغة ولونها الأحمر الغامق بعد ثلاثة أيام من الحضان، وكان شكل المستعمرة بعد أسبوع من الحضان ذات تقصص تحت الحافة الخارجية فيما انتشرت الصبغة في معظم المستعمرات ولغاية المنطقة الواقعة تحت حافة المستعمرة تحيطها منطقة فاتحة اللون ضيقة وتحدها من الخارج حافة المستعمرة المائلة إلى التقصيص نوعاً ما.

بدأت المستعمرات جافة وملتصقة بالوسط الزرعى وذات لون أحمر غامق منذ اليوم الثالث وحتى اليوم العاشر ولم تظهر اختلافات واضحة بين مستعمرات العزلات لهذه المجموعة (باستثناء عزلتين) كانت حافاتهما ملساء غير مفصصة.

أما المجموعة B والتي وضعت ضمن النوع *A. lipoferum* فقد كانت مستعمراتها (كما في الشكل 1) مؤلفة من ثلاثة مناطق مختلفة اللون بحيث تركزت الصبغة الحمراء في مركز المستعمرة وامتدت بالتساوي لتشغل حيزاً كبيراً من المستعمرة، وأحيطت بحلقة دائرية سوداء والتي كانت محاطة من الخارج بحلقة دائرية فاتحة اللون شاحبة اللون، واستمرت كذلك حتى اليوم العاشر، أما المستعمرة فكانت محدبة إذ كانت جميع العزلات المكونة للمستعمرات متجانسة الشكل ومتشابهة مع بعضها البعض ومع سلالة السيطرة Sp59b.



شكل (1): مستعمرات الأنواع التابعة لجنس *Azospirillum* بعد أسبوع من الحضان (a) *A. irakense*، (b) *A. brasilense* (c) *A. lipoferum*

قوة التكبير 25X

أما مستعمرات المجموعة C والتي كانت ضمن النوع *A. irakense* فقد تميزت بامتصاصها الصبغة ولكن بصورة أخف وكان لون المستعمرة وردي يميل إلى البرتقالي، وذات شكل دائري ومظهر لامع، فيما انتشرت الصبغة في معظم المستعمرة وأظهرت بداخلها خطوطاً شعاعية غير منتظمة تركزت في الأطراف بعد اليومين الثالث والرابع، وسرعان ما اتجهت هذه الخطوط نحو المركز بعد اسبوع من الحضانة (شكل 1) وكان شكل المستعمرة مرتفعاً أشبه بالقبة، فيما كان شكل المستعمرات لجميع العزلات متطابقاً ومتشابهاً إلى حد بعيد مع سلالة السيطرة KBCI.

ومما يثير الانتباه عدم نمو جميع عزلات المجموعتين A, B عندما استبدلت صبغة الكونغو الحمراء بصبغة المثل الحمراء وعلى نفس الوسط وذلك عندما تمت زيادة تركيز الصبغة إلى 150 ملغم/ لتر بدلاً من التركيز 37.5 ملغم/ لتر (وهذا التركيز هو الذي استخدم في جميع العزلات مع صبغة الكونغو الحمراء) أما المجموعة C فقد نمت جميع عزلاتها على هذا التركيز الأعلى، وهي نفس الملاحظة التي أشير لها في دراسة سابقة (24) ولكن كان التركيز المستعمل هو 200 ملغم/ لتر من صبغة المثل الحمراء وعليه ممكن استخدام هذه الصبغة كوسط انتقالي للنوع *A. irakense* لتمييزها عن النوعين السابقين بالتركيز المشار له أعلاه، وقد أشار (17) أن بعض الصبغات مثبتة لأنواع بكتيرية معينة أو ذات تأثير سمي ليتحول الوسط من عام إلى وسط انتقائي، وتتفق هذه الظاهرة مع ما توصلت إليه اللامي (20) حول تأثير تركيز صبغة المثل الحمراء على نمو بكتريا *Edwardsiella*. ولا بد من الإشارة إلى أن صبغة الكونغو الحمراء تمتاز بصغر وزنها الجزيئي وسرعة ذوبانها في الماء إضافة إلى انتشارها داخل المستعمرة (18) ويشار إلى نفاذية سطح الخلية لهذه الصبغة والتي تتحد مع السكريات المتعددة والبروتين لتشكل معقد ما يلبث أن يتغير من حالة لأخرى بسبب العملية الأيضية أو النمو أو طرح الصبغة نتيجة العمليات الأيضية نحو مركز المستعمرة (20)، وربما يعود التباين في الألوان للمستعمرة الواحدة إلى إن خلايا البكتريا الموجودة بالقرب من محيط المستعمرة أكثر نشاطاً وحيوية لتتخلص من فعل الصبغة فتطرحها خلفها نحو مركز المستعمرة لذا تركزت الصبغة غالباً في مركز المستعمرة وفقدانها أو قلتها في المنطقة الواقعة بالقرب من حافاتها.

أثبتت النتائج أعلاه إن استخدام صبغة الكونغو الحمراء أعطت نتائج واضحة ورتبت العزلات جميعاً إلى ثلاثة مجاميع كان لها صلة أو ارتباط واضح تماماً بتقسيم العزلات استناداً إلى خصائصها المورفولوجية والكيموحيوية بحيث إن المجموعة التي تشابهت خصائصها الكيمو حيوية تشابهت كذلك في شكل المستعمرات وانتشار الصبغة والمناطق التي تكونت في المستعمرة.

ومن الملاحظات الأساسية في هذه الدراسة أن النتائج برهنت إن إعداد العزلات التي تم الحصول عليها فاقت كثيراً تلك تم الحصول الحصول عليها في دراسات سابقة في العراق (7، 24، 30) بل وأسعدت في العزل والتلقيح والتشخيص إذ إن استخدام صبغة الكونغو الحمراء قد أدى إلى التغلب على العديد من الصعوبات التي واجهت دراسة سابقة (7) عندما استخدمت فيها أوساط صلبة غير الأوساط الحاوية على الصبغة. كذلك يتبين من جدول (2) أنه من أصل (151) عزلة تابعة لبكتريا *Azospirillum* فإن (72) عزلة تم الحصول عليها من منطقة الجذر وقد شكل النوع *A. irakense* أكثر من نصف العدد من تلك المنطقة 45 عزلة وهذه النتيجة

منسجمة نوعاً ما مع دراسة سابقة (7) كما إن عزلها من المنطقة الجذرية قد يعود إلى تمكن عزلات هذا النوع من احتمالية اختراق خلايا الجذر ربما بسبب قابليته على تحلل البكتين (10) ومهاجمة السليلوز (31) واللذان يؤلفان جزءاً من الصفيحة الوسطى وجدار الخلية على التوالي هذا إضافة إلى إن استخدام صبغة الكونغو الحمراء ربما انعكس على سهولة عزل هذه المجموعة كما أدى إلى رفع نسبة العزلات لهذا النوع إلى (31%) من مجموع العزلات بعد أن كانت هذا النسبة لا تتجاوز (22%) (24) وبرهنت هذه النسبة لعزلات النوع A. *irakense* على تردد وانتشار هذا النوع من الأراضي العراقية الخاصة بزراعة الرز مما يعزز الدراسات السابقة (24،7).

جدول (2) توزيع أعداد العزلات المشخصة التابعة لجنس *Azospirillum* من المواقع البيئية المختلفة

عدد العزلات المشخصة التابعة لبكتريا <i>Azospirillum</i>			عدد العزلات في الموقع البيئي		عدد العزلات لكل محافظة	اسم المحافظة
<i>A. irakens</i>	<i>A. lipoferum</i>	<i>A. brasilense</i>	منطقة الجذر المعقمة	تربة الرايزوسفير		
12	4	24	19	21	40	النجف
16	5	31	29	23	52	ديالى
19	7	33	24	35	59	القادسية
(C)47	(b)16	(a)88	72	79	151	المجموع

(a) = 88 عزلة تابعة للنوع *A. brasilense* (منها 65 عزلة من تربة الرايزوسفير و 23 من الجذر)

(b) = 16 عزلة تابعة للنوع *A. lipoferum* (منها 12 عزلة من تربة الرايزوسفير و 4 من الجذر)

(c) = 47 عزلة تابعة للنوع *A. irakens* (منها 2 عزلة من تربة الرايزوسفير و 47 من الجذر)

ومن ملاحظة أعداد العزلات ظهر إن النوع *A. brasilense* هو السائد في التربة العراقية مقارنة بالأنواع الأخرى (جدول 2) وهي نفس الملاحظات التي وردت في دراسات سابقة (30،24،7) وهي منسجمة مع النتائج التي توصل لها (32) لترتب حقول الرز في مصر وفي مالي (9) وفي اليونان (22) وفي المناطق أخرى في العالم.

نستنتج من هذه الدراسة إن صبغة الكونغو الحمراء ممكن استخدامها بكفاءة عالية للتسريع في تمييز الأنواع التابعة لجنس *Azospirillum* إضافة إلى ضرورة إجراء بعض الاختبارات الكيمو حيوية والظاهرية الأساسية التفريقية بين الأنواع وعدم إضاعة الوقت بإجراء الكثير من تلك الفحوصات فضلاً عن أن هذه الطريقة (استخدام الصبغة) قد استبعدت مجاميع كثيرة من البكتريا المثبتة للنتروجين المصاحبة مما يدل على فعاليتها ومتماشياً مع التأكيدات السابقة لاستخدام هذه الصبغة (2، 12، 20).

References

- 1- Eckert, B; Weber, OB, Kirchhof, G, Halbritter, A; Stoffels, M; Hartman, A.. *Azospirillum doebereinera* sp nov. a nitrogen fixing bacterium associated with the C – 4 grass Miscanthus. Int. J. S. Evol. Microbiol. 51, PP. 17 – 26. (2000).
- 2- Somers; E. D.Ptacek; P. Gysegom; M. Srinivasan, and I. Vanderleyden. *Azospirillum brasilense* produces the Auxin – like phenylacetic acid by using the key enzyme for Indole – 3 – Acetic Acid Biosynthesis. Appl. Environ. Microbiol. 71:1803 – 1810. (2005).
- 3- Bashan, Y; Bustillos, T.T.; Leyva, L.A., Hernandez, T. P, and Bacilio M.. Increase in auxiliary Photoprotective photosynthetic pigments in wheat seedlings induced by *Azospirillum brasilense*. Biology and Fertility of Soils 42: 279 – 285. (2005).
- 4- Doberciner, J. Baldani, V. L. D. and Reis, V. M. Endophytic occurrence of diazotrophic bacteria in non – Leguminous crop. In: *Azospirillum* VI and related microorganisms. I. Fendrik, M. de Gallo, J. Vanderleyden and M. de Zamarocy (eds) p: 3 – 14. Springer – verlag. Berlin (1995).
- 5- Mehnaz, S. B. Weselowski, and G. Lazarovits. *Azospirillum zaeae* sp. nov., a nitrogen fixing bacterium isolated from corn rhizosphere soil of zeamays. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., December.1 , 57 (12) 2805 – 2809. (2007).
- 6- Mehnaz, S. B. Weselowski, and G. Lazarovits. *Azospirillum canadense* sp. nov., a nitrogen – fixing bacterium isolated from corn rhizosphere Int. J. Syst. Evol. Microbiol., March., 1;57 (3): 620 – 624 (2007).
- 7- Khammas, K.M; Ageron, E.; Grimont, P. A. D and Kaiser, P. *Azospirillum irakense* sp. nov., a nitrogen fixing bacterium associated with rice roots and rhizosphere soil. Res. Microbiol. 140: 679 - 693. (1989).
- 8- Peng, G. H. Womg; G. Zhang; W. Hou; Y, Liu; E. T. Wang, and Z. Tan. *Azospirillum melinis* sp. nov., a group of diazotrophs isolated from tropical molass grasses. Int. J. Syst Evo. Microbiol., June 1, 56 (6): 1263 – 1271 (2006).

- 9- Kabir, M. and Faure, D. Identification of *Azospirillum* by Oligonucleotide probes after isolation from a soil and sorghum rhizosphere contaminated or not by parasitic plant: striga. In: *Azospirillum* V I and related microorganisms. I. Fendrik, M. de Gallo, J. Verlag Berlin. (1995).
- 10- Khammas, K. M. Interactions nutritionnelles entre bacteries fixatrices d` azote et bacteries pectinolytiques. Thesis of doctorate. University of Paris 7 France. (1991)
- 11- Boyer, M. J. Haurat, S. Samain, B. Segurens, F; Govry, V. FGonzalez, P. Mavingui. R. Rphr, R. Bally, and F. Wisniewski - Dye. Bacteriophage Prevalence in the Genus *Azospirillum* and Analysis of the first Genome Sequence of an *Azospirillum brasilense* integrative Phage. Appl. Environ. Microbiol., February 1, 74 (3): 861-874 (2008).
- 12- Rodrigues- Caceres, E. A. Improved medium for isolation of *Azospirillum* spp. Appl. Environ. Microbiol. 44: 990- 991 (1982).
- 13- Xie C. H. and A. Yokota. *Azospirillum oryzae* sp. nov. , a nitrogen fixing bacterium isolated from the roots of the rice plant *Oryza sativa* Int. J. Syst. Evol. Microbiol. July 1.; 55 (4): 1435. (2005)
- 14- Hegazi, N. A. and Monib, M. Enumeration of nitrogen fixing spirilla. Soil Biol. Biochem. 11: 437- 438. (1979).
- 15- Tyler, M. E; Milam, I. R.; Smith, R. L.; Sahank, S. C and Zuberer, D. A. Isolation. of *Azospirillum* from divers geographic regions. Can J. Microbiol. 25: 693- 697. (1979).
- 16- Ogran, A. and Feng, X. Methods of soil community analysis. pp: 422- 430. In: Manual of Environmental Microbiology. C. J. Hurst, G. R. Knudsen, M. J. McInerney, L. D. Stetzenbach, and M. V. Walter (eds). American Society of Microbiology. Washington. (1997).
- 17- Swatek, F. E. Textbook of Microbiology. The C. V Mosby Company. (1967).
- 18- Heden, C. and Illeni, T. New approaches to the identification of microorganisms A Wiley Biomedical- Health Publications (1975).
- 19- Surgall, M. T. and Beesley, E. D Congo Red- Agar plating medium for detection pigmentation in *Pasteurella pestis*. Appl. Microbiol. 18: 834- 837.(1969).

- 20 -اللامى سندس هادى. دور الصباغ الحىوية والاشعة فوق البنفسجية فى تشخيص افراد العائلة المعوية. رسالة ماجستير - كلية الطب/ جامعة بغداد (1993).
- 21- Fred. E.B. and Waksman. S. A. Laboratory manual of microbiology P. 33 and 96. McGraw- Hill Book Co. New York. (1928).
- 22- Kefalogianni, I. Flouri, F. and Balis, C. Occurance, Isolation and identification of *Azospirillum* strains in Greece. In: *Azospirillum* V I and related microorganisms. I. Fendrik, M. de Gallo, J. Vanderleydn, and M. de Zamarocy. (eds). P: 461- 465. (1995).
- 23- Bashan, Y. and Levanony, H. An improved selection technique and medium for the isolation and enumeration of *Azospirillum brasilense*. Can. J. Microbiol. 31:947- 952. (1985).
- 24 -مهدي، ندى زكى. عزل وتشخيص وكثافة بكتريا *Azospirillum* فى المنطقة الجذرية لنبات الرز فى محافظة ديالى. رسالة ماجستير. كلية العلوم- الجامعة المستنصرية (1995).
- 25- Patriquin, D. G. and Dobereiner, J. Light microscopy observations of tetrazolium- reducing bacteria in the in the endorhizosphere of maize and other grasses in Brazil. Can. J. Microbiol. 24: 734- 742. (1978).
- 26- Turner, G. L. and Gibson, A. H.. Measurment of nitrogen fixation by indirect means: p. 111- 138. In: Methods for evaluating biological nitrogen fixation, F. J. Bergersen (ed). John Wiley and Sons Ltd. Chichester, England. (1980).
- 27- Thompson, J. A.; Gemell, L.G.; Roughly, R. J. and Evans, J. Nitrogenase activity associated with pasture grasses in northern New South Wales. Soil. Boil. Biochem. 66: 217- 222 (1984).
- 28- Holt, J. G. Krieg, N. R. Sneath, P. H. A. Staley, J. T. and Williams S. T. Bergeys Manual of determinative Bacteriology. 9th (ed) Williams and Wilkins. (1994).
- 29- Khammas, K. M. Ageron, E. Grimont, P. A. D. and Kaiser, P. The nitrogen-fixing bacteria from Iraqi rice- field soils. Eur. J. Soil Biol. 30: 101- 106. (1994).

30- Al- Maadhidi, J. F. Isolation and characterization of *Azospirillum* spp. From Iraqi wheat cultivars. J. University of Kuwait (science). 16: 343- 348. (1989).

31 -خماس، خليل مصطفى. تحليل السليلوز وتنشيط النتروجين بواسطة بكتريا *Azospirillum* مجلة علوم المستنصرية. المجلد 13. العدد (1). 10 -1 (2002).

32- Omar, A. M.; Richard, C.; Weinhar, P. and Balandear, J. Using the spermosphere model technique to describe the dominant nitrogen-fixing microflora associated with wetland rice in two Egyptian soil. Biol. Fertil. Soil. 7: 156- 163. (1989).